



# FAVİPİRAVİR KULLANIMI




İlaçlarınız aşağıdakilerden biriyse arka sayfadaki talimatlara göre kullanınız.

İlaçlarınızı aldıgınızda ilk dozunuza gecikmeden başlayınız.

Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa doktorunuza danışınız.

İlaç kullanırken emzirmeyiniz.





İlacınızın kullanım süresi **5** gündür.  
İlacınızı tercihen tok karına almanız tavsiye edilir.

İlacınızı kullandıktan sonra kutucuğu işaretleyiniz.

İlaç dozlarınızı **12 saat arayla 1 bardak su** ile kullanınız.

Herhangi bir yan etki gördüğünüzde veya şikâyetlerinizde artış olması durumunda doktorunuza başvurunuz.

**1. GÜN**

**1. doz: 8 tableti bir bardak suyla içiniz.**

\*Tedavinin başarısı için ilk dozun 8 adet alınması önemlidir.

**2. doz: 8 tableti bir bardak suyla içiniz.**

\*Tedavinin başarısı için ikinci dozun 8 adet alınması önemlidir.



**2. GÜN**

**3. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**

**4. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**



**3. GÜN**

**5. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**

**6. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**



**4. GÜN**

**7. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**

**8. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**



**5. GÜN**

**9. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**

**10. doz: 3 tableti bir bardak suyla içiniz.**



\*İlacınızın kullanma talimatına [www.titck.gov.tr/kubkt](http://www.titck.gov.tr/kubkt) adresinden ulaşabilirsiniz.  
İlaç etkileşimleri için kullanma talimatını okuyunuz.